



KIHOMADOT

Kihomadot ovat yleistyneet. Peräaukon kutina etenkin öisin voi olla oire kihomatotartunnasta. Toisaalta kihomatotartunta voi olla täysin oireetonkin. Kihomato on noin sentin mittainen ja vajaan millin levyinen läpikuultava mato, joka elää paksusuolen loppupäässä. Tauti tarttuu munista, joita naaraat munivat peräaukon seutuun. Madon munat ovat näkyvämmän pieniä ja säilyvät hengissä huoneenlämmössä jopa viikkoja. Ne leviävät helposti käsistä, leluista, vuodevaatteista, kodin tekstiileistä ja kosteista pesutiloista. Munat kulkeutuvat suun ja hengityksen kautta suolistoon ja kehittyvät muutamassa viikossa madoiksi.

Lääkehoito:

- Apteekista saa ilman reseptiä matolääkettä kihomadon häätöön.
- **Noudata pakkauksen mukana olevia käyttöohjeita.**
- Hoitoa suositellaan koko perheelle ja se kannattaa uusia parin viikon kuluttua.

Muut toimenpiteet:

Lääkehoidon lisäksi suositellaan noudatettavaksi seuraavia toimenpiteitä uusiutumiskehityksen välttämiseksi.

- Peseydytään hyvin. Koska madonmunia on juuri peräaukon ympärillä, huolehditaan erityisesti alapesusta ja käsienpesusta.
- Muistuta lapsia käsien pesusta. Kädet pestään huolellisesti aina wc-käynnin jälkeen ja ennen ruokailua.
- Pidä kynnet lyhyenä ja puhtaina.
- Vaihda hoidon yhteydessä alusvaatteet, yöpuku, pyyheliinat, tynyliinat ja lakanat. Laita ne heti pesuun ja vältä ravistelua.
- Alushousut on syytä vaihtaa viikon ajan kahdesti päivässä, koska madonmunat saattavat olla elinkykyisiä useita päiviä, jopa viikon hoidon jälkeen.
- Tuuleta muut vuodevaatteet huolellisesti.
- Erityisesti makuuhuone kannattaa siivota perusteellisesti lääkityksen jälkeisenä päivänä. Imuroi ja pyyhi lattiat ja muut pinnat.
- Puhdista myös ovenkahvat ja valokatkaisijat.
- Pese myös wc-tilojen pinnat, hanat ja vessan vetonupit.
- Pese lelut ja poista pehmolelut käytöstä kuukauden ajaksi.
- Jos matoja on nähtävissä taas kuukauden kuluttua, on hoito epäonnistunut, ja se pitää uusia.

Kouluun voi tulla hoitokäsittelyä seuraavana päivänä !