

Maitohampaiden tapaturmat

Pienillä lapsilla maitohampaat sijaitsevat kehittyvien pysyvien hampaiden välittömässä läheisyydessä. Maitohammastapaturmat voivat joskus aiheuttaa vaurioita pysyviin hampaisiin, erityisesti silloin, kun maitohammas työntyy sisäänpäin.

Maitohammastapaturmat ovat kuitenkin yleensä lieviä, ja paranevat hyvin. Maitohampaan vahingoituttua on aina hyvä käydä hammaslääkärin vastaanotolla.

Älä koskaan laita irronnutta maitohammasta takaisin kuoppaansa!

Pysyvien hampaiden tapaturmat

Ota yhteyttä hammashoitolaan, jos

- hampaasta on murtunut palanen
- hammas heiluu tai se on irronnut kokonaan
- hammas on siirtynyt paikaltaan
- hammasta aristaa tai se tummuu
- hammas tulee kuumalle araksi
- hampaan kohdalle ikeneen tulee märkápatti
- suussa tai huulella on ompelua vaativa haava

Hammasmurtuma

Hampaan kruunun murtumisissa voi paljastua kipuherkkää hammaspintaa ja hampaan ydin. Tämä voi aiheuttaa kipua tai vihlontaa. Murtuma voidaan usein hoitaa paikkaamalla, joskus hammas täytyy myös juurihoitaa.

Paikaltaan siirtynyt hammas

Lievin siirtymävamma on hampaan tärähdys. Tällöin hammas on hyvin paikoillaan, vaikka se voi aristaa purtaessa. Pahemmissa siirtymävammoissa hammas voi olla eri asennossa kuin aiemmin, mutta ei ole liikkuva. Siirtymävamman tapahduttua on aina hakeuduttava hammaslääkärin hoitoon. Siirtynyt hammas on oikaistava muutaman päivän kuluessa tapaturmasta, mahdollisimman pian.

Irronnut hammas

Jos irronnut hammas on likaantunut, puhdista se kevyesti ja varovasti huuhtomalla maidolla tai kylmällä vedellä. Älä kosketele hampaan juuriosaa. Aseta hammas takaisin kuoppaansa. Voit purra kevyesti nenäliinaan pitääksesi takaisinasetetun hampaan paikallaan. Jos et saa hammasta takaisin kuoppaansa, laita se mieluiten maitoon tai keittosuolaliuokseen. Jos näitä ei ole saatavissa, hammasta voi säilyttää suussa. Ota aina yhteys päivystävään hammaslääkärin mahdollisimman pian.